

FAQ (FREQUENTLY-ASKED-QUESTIONS) VANCOMYCIN EBERTH 500 mg ODER 1 g

Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung und einer Lösung zum Einnehmen

Nachfolgend haben wir für Sie die TOP FAQ („Frequently-Asked-Questions“ = „Häufig-Gestellte-Fragen“) zur oralen Gabe von **Vancomycin Eberth Pulver** zusammengestellt.

Es handelt sich hierbei um Auszüge aus den Fach-/Gebrauchsinformationen und ggf. erweiterte Erklärungen zur Anwendung.

Falls Sie zu Ihrer Frage keine Information finden, freuen wir uns auf Ihren Anruf unter: **+499628923767-0**.

Fragen zur ORALEN Gabe

1. Mit was und wie ist *Vancomycin Eberth 500 mg bzw. 1 g Pulver (Trockensubstanz)* bei oraler Gabe zu lösen?

Zum Auflösen des Pulvers nimmt man frisches Leitungswasser: 10 ml werden zum Auflösen von *Vancomycin Eberth 500 mg* benötigt und 20 ml zum Auflösen von *Vancomycin Eberth 1 g*. Das entsprechende Volumen wird mittels einer Spritze durch den Gummistopfen in die Durchstechflasche injiziert.

WICHTIG: Danach die Durchstechflasche gut schütteln, so dass sich das darin befindliche Pulver vollständig auflöst.

2. Wie ist das genaue Mischverhältnis bzw. die entsprechende Wassermenge bei der oralen Gabe von *Vancomycin Eberth 500 mg bzw. 1 g Pulver*?

Vancomycin Eberth 500 mg:

Lösen Sie das Pulver mit **10 ml** frischem Leitungswasser auf. Diese Lösung ziehen Sie dann mit Hilfe einer Spritze aus der Durchstechflasche auf und geben sie in ein Trinkglas. In das Trinkglas fügen Sie nochmals **20 ml** frisches Leitungswasser hinzu.

Vancomycin Eberth 1 g:

Lösen Sie das Pulver mit **20 ml** frischem Leitungswasser auf. Diese Lösung ziehen Sie dann mit Hilfe einer Spritze aus der Durchstechflasche auf und geben sie in ein Trinkglas. In das Trinkglas fügen Sie nochmals **40 ml** frisches Leitungswasser hinzu.

3. Wie lange ist *Vancomycin Eberth Pulver* nach dem Auflösen haltbar?

Aufgelöst ist *Vancomycin Eberth Pulver* im Kühlschrank bis zu 24 Stunden haltbar.

4. Kann zum *Vancomycin Eberth Pulver* auch ein Geschmack dazugegeben werden (z. B. in Form von süßem Saft / Sirup)?

Ja, es kann ein Geschmackskorrigens hinzugefügt werden.

FAQ (FREQUENTLY-ASKED-QUESTIONS)

5. Wie funktionieren Teilgaben von *Vancomycin Eberth Pulver*?

Für Teilgaben muss die Gesamtdosis geteilt werden.

Im Folgenden sind zwei repräsentative Beispiele für Teilgaben schrittweise beschrieben:

Vancomycin Eberth 500 mg in Teilgaben **4-mal täglich (125 mg / Einzelgabe):**

1. **10 ml** frisches Leitungswasser mit Hilfe einer Spritze in die Durchstechflasche durch den Gummistopfen injizieren.
2. Schütteln bis das Pulver komplett aufgelöst ist.
3. Bei **jeder Einzelgabe 2,5 ml** (10 ml : 4 Teilgaben = 2,5 ml pro Einzelgabe) aus der Durchstechflasche entnehmen.
Das entspricht einer Einzelgabe von 125 mg Vancomycin.
4. Diese 2,5 ml-Lösung in ein Trinkglas geben und ca. 10 ml Wasser hinzufügen.
5. Die restliche Lösung in der Durchstechflasche wieder unmittelbar in den Kühlschrank bis zur nächsten Gabe (siehe Schritt 3) stellen.

Vancomycin Eberth 1 g in Teilgaben **4-mal täglich (250 mg / Einzelgabe):**

1. **20 ml** frisches Leitungswasser mit Hilfe einer Spritze in die Durchstechflasche durch den Gummistopfen injizieren.
2. Schütteln bis das Pulver komplett aufgelöst ist.
3. Bei **jeder Einzelgabe 5 ml** (20 ml : 4 Teilgaben = 5 ml pro Einzelgabe) aus der Durchstechflasche entnehmen.
Das entspricht einer Einzelgabe von 250 mg Vancomycin.
4. Diese 5 ml-Lösung in ein Trinkglas geben und ca. 20 ml Wasser hinzufügen.
5. Die restliche Lösung in der Durchstechflasche wieder unmittelbar in den Kühlschrank bis zur nächsten Gabe (siehe Schritt 3) stellen.